


STATISTIQUES MONDIALES

L'ÉPIDÉMIE À VIH/SIDA DANS LE MONDE EN 2013



35 millions

de personnes vivaient avec le VIH en 2013
(contre 34,6 millions en 2012)



1,5 million

de personnes sont décédées des suites du sida
en 2013 (contre 2,4 millions en 2005)

2,1 millions



de personnes infectées par le VIH
en 2013 (contre 2,2 millions en 2012 - 3,4 en 2001)

12,9 millions



de personnes vivant avec le VIH ont
eu accès aux traitements (37% des VIH+)

320 000



décès parmi les
personnes séropositives au VIH
ont été causés par la tuberculose

19,1 milliards



de dollars mis à disposition de la lutte
contre le sida en 2013

- En 2013, 35 millions de personnes [33,2 millions–37,2 millions] vivaient avec le VIH.

Depuis le début de l'épidémie environ 78 millions de personnes [71 millions–87 millions] ont été infectées par le VIH et 39 millions de personnes [35 millions–43 millions] sont décédées de maladies liées au sida.

Nouvelles infections à VIH

- Les nouvelles infections à VIH ont chuté de 38% depuis 2001.

Dans le monde, 2,1 millions de personnes [1,9 million–2,4 millions] ont été nouvellement infectées par le VIH en 2013, contre 3,4 millions [3,3 millions–3,6 millions en 2001].

- Les nouvelles infections à VIH parmi les enfants ont diminué de 58% depuis 2001.

Dans le monde, 240 000 enfants [210 000–280 000] ont été nouvellement infectés par le VIH en 2013, contre 580 000 [530 000–640 000] en 2001.

Décès liés au sida

- Les décès liés au sida ont chuté de 35% depuis le pic de 2005.

En 2013, 1,5 million de personnes [1,4 million–1,7 million] sont décédées de causes liées au sida dans le monde, contre 2,4 millions [2,2 millions–2,6 millions] en 2005.

Thérapie antirétrovirale

- En 2013, environ 12,9 millions de personnes vivant avec le VIH avaient accès à la thérapie antirétrovirale.

Cela représente 37% [35%-39%] de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH.

38% [36%-40%] de l'ensemble des adultes vivant avec le VIH bénéficient d'un traitement, cependant seuls 24% [22%-26%] de l'ensemble des enfants vivant avec le VIH bénéficient des médicaments salvateurs.

VIH/Tuberculose

- Les décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH ont diminué de 33% depuis 2004.

La tuberculose reste la principale cause de décès parmi les personnes vivant avec le VIH, avec une estimation de 360 000 décès [310 000–410 000] en 2013.

En 2013, le pourcentage de patients atteints de tuberculose identifiés comme séropositifs au VIH qui ont entamé ou poursuivi un traitement antirétroviral atteignait 70% (contre 60% en 2012).

Investissements

- US\$ 19,1 milliards étaient disponibles (toutes sources confondues) pour la riposte au sida en 2013.

Le besoin annuel estimé d'ici à 2015 se monte actuellement à US\$ 22–24 milliards.

- En 2013, les investissements domestiques en provenance des pays à revenu faible ou intermédiaire représentaient près de la moitié du total des dépenses liées au VIH.

STATISTIQUES REGIONALES

❖ Afrique subsaharienne

- En 2013, **24,7 millions [23,5 millions – 26,1 millions]** de personnes vivaient avec le VIH en Afrique subsaharienne.

Les femmes représentent **58%** du nombre total des personnes vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne.

- En 2013, on estimait à **1,5 million [1,3 million – 1,6 million]** le nombre des nouvelles infections à VIH en Afrique subsaharienne.

Les nouvelles infections ont diminué de **33%** entre 2005 et 2013.

L'Afrique subsaharienne représente presque **70%** du total des nouvelles infections à VIH dans le monde.

- En Afrique subsaharienne, **1,1 million [1,0 million – 1,3 million]** de personnes sont décédées de causes liées au sida en 2013.

Entre 2005 et 2013, le nombre des décès liés au sida en Afrique subsaharienne a chuté de **39%**.

- La couverture du traitement est de **37%** de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne.

67% des hommes et **57%** des femmes ne bénéficiaient pas du traitement antirétroviral en Afrique subsaharienne en 2013.

Trois personnes sur quatre sous traitement antirétroviral vivent en Afrique subsaharienne.

Au **Nigéria**, **80%** des personnes n'ont pas accès au traitement.

- En 2013, il y a eu **210 000 [180 000 – 250 000]** nouvelles infections à VIH parmi les enfants en Afrique subsaharienne.

Depuis 2009, il y a eu une diminution de **43%** des nouvelles infections à VIH parmi les enfants dans les **21 pays prioritaires** du Plan mondial en Afrique.

❖ Asie et Pacifique

- En 2013, **4,8 millions [4,1 millions – 5,5 millions]** de personnes vivaient avec le VIH en Asie et dans le Pacifique.

- En 2013, on estimait à **350 000 [250 000 – 510 000]** le nombre des nouvelles infections à VIH dans la région.

Les nouvelles infections à VIH ont diminué de **6%** entre 2005 et 2013.

L'Indonésie est une source de préoccupation – les nouvelles infections à VIH ont augmenté de **48%** depuis **2005**.

- En Asie et dans le Pacifique, **250 000 [210 000 – 290 000]** personnes sont décédées de causes liées au sida en 2013.

Entre 2005 et 2013 le nombre des décès liés au sida dans la région a chuté de **27%**.

L'Inde représente **51%** de l'ensemble des décès liés au sida dans la région.

- La couverture du traitement est de **33% [28 – 38]** de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH en Asie et dans le Pacifique.
- On estime que **3,1 millions** d'adultes ne bénéficiaient pas du traitement antirétroviral en Asie et dans le Pacifique en 2013.

Dans deux pays seulement de l'Asie et du Pacifique, la Thaïlande et le Cambodge, plus de 50% de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH sont actuellement sous traitement antirétroviral.

- En 2013, il y a eu **22 000 [18 000 – 32 000]** nouvelles infections à VIH parmi les enfants en Asie et dans le Pacifique.

Depuis 2009, il y a eu une diminution de **15%** des nouvelles infections à VIH parmi les enfants dans la région.

❖ Amérique latine

- En 2013, **1,6 million [1,4 million – 2,4 millions]** de personnes vivaient avec le VIH en Amérique latine.
- En 2013, on estimait à **94 000 [71 000 – 170 000]** le nombre des nouvelles infections à VIH dans la région.

Les nouvelles infections à VIH ont baissé de **3%** entre 2005 et 2013.

- En Amérique latine, **47 000 [39 000 – 75 000]** personnes sont décédées de causes liées au sida en 2013.

Entre 2005 et 2013, le nombre des décès liés au sida dans la région a chuté de **31%**.

- La couverture du traitement est de **45% [33 – 51]** de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH en Amérique latine.
- En 2013, il y a eu **1800 [<1000 – 7400]** nouvelles infections à VIH parmi les enfants en Amérique latine.

❖ Europe occidentale et centrale et Amérique du Nord

- En 2013, **2,3 millions [2,0 millions – 3,0 millions]** de personnes vivaient avec le VIH en Europe occidentale et centrale et en Amérique du Nord.

Les États-Unis représentent **56%** des personnes vivant avec le VIH dans cette partie du monde.

- En 2013, on estimait à **88 000 [44 000 – 160 000]** le nombre des nouvelles infections à VIH dans la région.
- En Europe occidentale et centrale et en Amérique du Nord,

27 000 [23 000 – 34000] personnes sont décédées de causes liées au sida en 2013.

Entre 2005 et 2013, le nombre des décès liés au sida dans la région a baissé de **2%**.

- La couverture du traitement est de **51% [39 – 60]** de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH.
- En 2013, il y a eu **<500 [<200 – <500]** nouvelles infections à VIH en Europe occidentale et centrale et en Amérique du Nord.

❖ Europe orientale et Asie centrale

- En 2013, **1,1 million [980 000 – 1,3 million]** de personnes vivaient avec le VIH en Europe orientale et en Asie centrale.
- En 2013, on estimait à **110 000 [86 000 – 130 000]** le nombre des nouvelles infections à VIH dans la région.

Les nouvelles infections à VIH ont augmenté de **5%** entre 2005 et 2013.

- En Europe orientale et en Asie centrale, **53 000 [43 000 – 69 000]** personnes sont décédées de causes liées au sida en 2013.

Entre 2005 et 2013, le nombre des décès liés au sida dans la région a augmenté de **5%**.

- La couverture du traitement est de **21% [18 – 24]** de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH en Europe orientale et en Asie centrale.
- En 2013, il y a eu **<1000 [<1000 – 1200]** nouvelles infections à VIH parmi les enfants en Europe orientale et en Asie centrale.

❖ **Caraïbes**

- En 2013, **250 000 [230 000 – 280 000]** personnes vivaient avec le VIH dans les Caraïbes.
- En 2013, on estimait à **12 000 [9400 – 14 000]** le nombre des nouvelles infections à VIH dans la région.

Les nouvelles infections ont baissé de **40%** entre 2005 et 2013.

- Dans les Caraïbes, **11 000 [8300 – 14 000]** personnes sont décédées de causes liées au sida en 2013.

Entre 2005 et 2013, le nombre des **décès liés au sida dans la région a chuté de moitié.**

Haïti représentait **59%** de l'ensemble des décès liés au sida dans la région en 2013.

- La couverture du traitement est de **42%** des personnes de 15 ans ou plus vivant avec le VIH dans les Caraïbes – une **augmentation de 31% depuis 2011.**
- En 2013, il y a eu **<1000 [<500 – <1000]** nouvelles infections à VIH parmi les enfants dans les Caraïbes.

❖ **Moyen-Orient et Afrique du Nord**

- En 2013, **230 000 [160 000 – 330 000]** personnes vivaient avec le VIH au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
- En 2013, on estimait à **25 000 [14 000 – 41 000]** le nombre des nouvelles infections à VIH dans la région.

Les nouvelles infections à VIH ont augmenté de **7%** entre 2005 et 2013.

- Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord **15 000 [10 000 – 21 000]** personnes sont décédées de causes liées au sida en 2013.

Entre 2005 et 2013, le nombre des décès liés au sida dans la région a augmenté de **66%**.

- La couverture du traitement est de **11% [8 – 16]** des personnes vivant avec le VIH au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
- En 2013, il y a eu **2300 [1500 – 3400]** nouvelles infections à VIH parmi les enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

(Source rapport ONUSIDA 2014)

❖ **En Mauritanie**

En 2013, on estime le taux de prévalence à **0.4%** dans la population générale et à **5%** dans certains groupes à hauts risques, Le nombre de personnes vivant avec le VIH à **13000**, le nombre de nouvelles infections par le VIH à **2800**, et le pourcentage de PVVIH qui ont accès au traitement à **45,4%**.

(Source rapport CNLS 2014)